

7.2.5. Формирование шкалы «Лист суицидоопасности»

Войти в систему под правами «Врач амбулатории (СМП)». Перейти в подсистему «Контроль исполнения» - «АРМ врача Поликлиника» (рис.1).




Рисунок 1. Открытие АРМ врача поликлиники

Добавить пациента на прием, перейти на вкладку «Общие документы». На форме выбора ШМД выбрать «Шкалы оценки состояния пациента» (рис.2).




Рисунок 2. Открытие шкалы «Лист суицидоопасности»

Открылась экранная форма шкалы. В поле «Вид шкалы» выбрать значение «Шкалы общего пользования». Открыть блок «Лист суицидоопасности». Выбрать факторы риска на форме и нажать кнопку «Документ готов» (рис. 3). В поле «Интерпретация» автоматически выводится результат прохождения шкалы.

Шкалы оценки состояния пациента

Возраст:

Дата:

Вид шкалы:

[Шкала Score \(абсолютный риск\) \(не заполнена\)](#)
[Шкала комы Глазго \(не заполнена\)](#)
[Шкала Ватерлоу \(не заполнена\)](#)
[Шкала хронического болевого синдрома \(не заполнена\)](#)
[Шкала PPS для оценки общей активности больных при паллиативном лечении \(не заполнена\)](#)
[Оценка риска падений Морса \(Morse Fall Scale\) \(не заполнена\)](#)
[Лист суицидоопасности](#)

Наличие суицида в анамнезе ☒

Факторы суицидального риска (ФСР)

Суицидальная активность, сохраняется. Отношение к суициду положительное	☐
Актуальность дезадаптирующей ситуации сохраняется	☒
Повторность суицидальных попыток в течение года	☐
Утрата социальных функций (работы, семьи, навыков самообслуживания)	☐
Депрессивное состояние с суицидальными попытками	☐
Суицидальные попытки в анамнезе	☐
Суммарный балл ФСР	1

Антисуицидальные факторы (АСФ)

Ликвидация дезадаптирующего конфликта или решение его альтернативным способом	☐
Устойчивое отрицательное отношение к суицидальной попытке, отсутствие суицидальной тенденции	☒
Наличие активных жизненных ориентаций (планы, замыслы)	☐
Восстановление социальных отношений и функций на их сниженном уровне	☐
Длительность заболевания более 3-5 лет	☐
Количество обострений, декомпенсаций более 2-3	☐
Суммарный балл АСФ	1

Итоговый суммарный балл

Интерпретация

Комментарии

Рисунок 3. Заполнение экранной формы ШМД «Лист суицидоопасности»

Система перевела пользователя на печатную форму МД. Нажать кнопку «Подписать» (рис. 4). Выбрать сертификат, указать пароль.




Рисунок 4. Подписание ШМД «Лист суицидоопасности»

Медицинский документ переведен в статус «Готов» и подписан ЭЦП врача.

Если интерпретация результата равна значению «Диспансерное наблюдение (Д-2) по 2 группе», то в новых и активных документах «Диспансерное наблюдение» у пациента будет отображаться галочка «Суицидальное поведение» (рис. 5).

← →
☆
Диспансерное наблюдение 000122182 от 03.07

Основное
История изменений

Провести и закрыть
Записать
Провести
Создать на основании ▾
 Печать ▾

План диспансерного наблюдения: 2 021-2 022 ▾

Данные диспансерного учета
Группы здоровья

Номер:

Пациент:

Дата рождения:

Случай:

Диагноз:

Дата взятия: 10.01.2017

Регистр:

Отягощенный семейный анамнез: ☐

Вид включения: Прочие ▾

Врач взявший на учет:

Специализация врача взявшего на учет:

Текущий врач ДН:

Специализация врача ДН:

План диспансерного наблюдения:

Суицидальное поведение: ☒

Рисунок 5. Отметка суицидального поведения пациента

Такая же отметка устанавливается в блоке «Особые отметки» на форме ОДП (рис. 6).

← → ☆ **История смены фамилии**

Основное Новый Заказ Программы Услуги Взаимодействия Соглашения Объединение пациентов Просмотр ЭМК

X Закрыть Смена + Добавить МД Служок рецептов Диспансерный учет Санаторно курортная карта Рабочий стол по

Пациент: **Иванов Иван Иванович** История смены фамилии
 Дата рождения: 01.01.1980 Данные пациента из архива
 Страховой номер ПФР: 01-01-010000000000
 Место рождения: **Москва** Узнать прикрепление к МО Прикр
 Узнать прикрепление по ТФОМС Терape
 Генког
 Код МО

ДЛП: **Иванов Иван Иванович, дата: 01.01.1980, пол: муж**

Идентификатор пациента в РМИС: 00000 Код в ТФОМС: 00000 Статус идентификации пациента: **Идентификация не пройдена**

Политы

Место работы: Пенсионер

Образование:

Особые отметки: **Суицидальное поведение**
 -1 Мотив дееспособности

Комментарий:
 <счет комментариев>

Рисунок 6. Отметка суицидального поведения пациента в ОДП



Убрать отметку о суицидальном поведении пациента можно с помощью повторного формирования шкалы. Если результатом ее прохождения будет результат, не относящийся к суицидальному поведению (любая диспансерная группа, кроме Д2), то при переводе документа в статус «Готов» отметка из документов будет убрана.